

四庫全書

子部

欽定四庫全書

世醫得效方卷五

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

脾胃

虛證丁沈透膈湯治氣滿不快飲食不入胃膈痞悶或
時膨脹腹中刺痛等證

丁香五錢 沈香五錢 木香五錢並 人參去蘆半兩 青皮去白

神麴

各一兩

茯苓

去皮

甘草

炙

陳皮

去白

厚朴

薑汁製

草果

仁

藿香葉

去土

半夏

洗七次

縮砂仁

去殼各二兩

白豆蔻

去殼白朮

去蘆炒

麥蘖

炒

香附子

炒去毛各一兩

右剉散每服三錢水一盞半入生薑三片紅棗一枚

同煎去渣熱服又方治氣滿不食以四味香蘇散同

煎大人尤宜服未效更服丁香散加薑撥良薑一

兩方見嘔吐類

穀神嘉禾散治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胸膈痞

悶脇助脹滿心腹刺痛可進飲食或多痰逆口苦吞酸
胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中焦虛痞不任攻擊
臟氣虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱
不能多食尤宜服之常服育神養氣和補脾胃進美飲
食

枇杷葉

去毛姜汁炙
令香熟一兩

石斛

細剉酒拌和
微炒一兩

沈香

鎊三分

薏苡仁

微炒一兩

木香

三分縮砂
一兩

去殼

杜仲

去粗皮用姜
汁與酒合和

塗炙令香
熟焦三分

藿香葉

去土
三分

隨風子

如無陳小紫訶子
實者亦得三分

穀蘖

微炒半兩

丁香

半兩

半夏

一分用湯洗七遍生薑一分切作片子與半夏同搗

爛做餅

子芡黃

白朮

去蘆炒二兩

青皮

去白二兩

大腹子

微炒三分

枳榔

炒半兩

陳皮

去白三分

桑白皮

微炒半兩

白豆蔻

微炒去皮半兩

人參

去蘆一兩

五味子

微炒半兩

白茯苓

去皮一兩

神麴

微炒一分

甘草

微炒

半兩

右剉散每服三錢水一盞入生薑三片肥棗二枚同

煎至七分溫服不拘時候及療四時傷寒能調理陰

陽使無變動尅日得安如療五噎入乾柿一枚同煎

十服見效如膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五枚同煎婦人亦可服

四君子湯治脾胃不調不思飲食

人參

去蘆

甘草

炙

白茯苓

去皮

白朮

去蘆

各等分

右判散每服三錢水一盞煎至七分不拘時服一方加橘紅名異功散又方加陳皮半夏名六君子湯嘔吐加藿香縮砂泄瀉加木香肉豆蔻

附子建中湯治脾氣虛寒腹脇脹滿身體沈重面色萎

黃嘔吐不食水穀不化大腑自利

肉豆蔻

麩裹煨

白豆蔻仁

附子

炮去皮臍

厚朴

去皮薑汁

拌炒

白朮

去蘆

乾薑

炮

紅豆

神麴

炒各一兩

丁香

胡椒

木香

不見火

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片紅棗一枚煎至七分去渣溫服

參苓白朮散理心脾氣弱神昏體倦飲食不進多困少力中滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉利

人參

白茯苓

去皮

白朮

去蘆

山藥

甘草

各一兩

縮砂

仁

桔梗

去蘆

薏苡仁

蓮肉

扁豆

薑汁浸去皮七錢半

右為末每服二錢東湯下小兒量歲數與之此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

千金養脾圓治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎塞反胃吐食心胸痞滿脇肋虛脹胸腹刺痛牽引背脊食少易傷言微氣短口苦舌澀惡心嘔噦喜睡噦酸夕病泄利腸胃虛滑病後氣不復常飲食無味形容憔悴酒後痰多

人參 白朮 白茯苓去皮 甘草 山藥炒 木香

丁香 白扁豆炒 縮砂仁 薏苡仁 益智仁

藿香葉 紅豆 肉豆蔻 乾薑炮 高良薑 三

稜炮 莪朮炮 神麴炒 麥蘖炒 陳皮 枳殼 茴香炒

苦梗炒各一兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼白湯下溫酒亦得空心食前常服溫養脾元進美飲食

治中湯治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉方見

傷寒陰

證類

平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口
苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體
瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎
八痞膈氣反胃並宜服之

蒼朮

去粗皮米湯浸
二日一斤二兩

厚朴

去粗皮薑
汁拌炒

陳皮

去白各
一兩二

錢

甘草

炒三分

右為末每服二錢以生薑三片紅棗二枚煎湯調服

或鹽湯調空心食前熱服常服調氣煖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣為散煎亦可加入

參尤妙

胃母朱砂稟太陰之精不經火煅以朮附等脾藥陰煉成用平補不僭善治真陽衰虛心火怯弱不養脾土沖和失布中州虛寒飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消痰逆惡心翻胃吐食臟氣虛寒米穀不化心腹絞痛泄利不止應是一切脾胃諸疾不問男子

婦人皆可服

朱砂

大塊不夾石者十二兩半

羅參

去蘆

縮砂

去殼

肉豆蔻

麝香裹

萆澄茄

白豆蔻

去殼

紅豆

高良薑

挫碎

附子

炮去皮臍

白朮

去蘆

厚朴

去皮薑汁拌炒

丁香

不見火

藿香葉

去土

五味子

去梗

乾薑

炮去土

胡椒

益智仁

麥門冬

去心

草果仁

橘紅

去白己上各一兩

右將人參等二十味各如法修製剉如豆大以銀鍋一口用白砂蜜二十兩將藥一半同蜜拌勻入銀鍋

內以夾生絹袋盛貯朱砂懸胎入銀鍋內以桑柴火重湯煮三日三夜取沙淘淨焙乾入乳鉢用玉槌研直候十分細米粽為丸如菰豆大陰乾每服十粒加至十五粒空心食前用人參湯送下棗湯亦得如或嘔吐用淡薑湯送下忌食猪羊血

補真丸大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不效者亦有謂焉人之有生不善攝養房勞過度真陽衰虛坎火不溫不能上蒸脾土沖和失布中州不運是致飲食不

進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑澹泄
此皆真火衰虛不能蒸蘊脾土而然古云補腎不如補
脾子謂補脾不若補腎腎氣若壯丹田火經上蒸脾土
脾土溫和中焦自治膈開能食矣

葫蘆巴

炒

附子

炮去皮臍

陽起石

煨

川烏

炮去皮

兔絲子

淘淨

沈香

不見火別研

肉豆蔻

麩裹煨

肉蓯蓉

酒浸焙

五味

子

去枝梗各半兩

鹿茸

去毛酒蒸焙

川巴戟

去心

鍾乳粉

各一兩

右為末用羊腰子二對治如食法葱椒酒煮爛入少

酒糊杵和為圓如梧子大每服七十九空心食前米飲鹽湯任下

進食散理脾元虛冷不思飲食久病脾虛全不食者及胃虛有風不食只三服便效

甘草

炙一兩

肉桂

去粗皮

良薑

炒

陳皮

去白

青皮

去穰各一分

訶子

五箇煨去核

草豆蔻

三箇去皮

川烏

一箇炮

右剉散每服二錢水一中盞生薑二片煎七分空心服

熱證瀉黃散治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴煩痛心
煩唇口乾燥壅滯不食

藿香葉

去土七錢

石膏

煨

縮砂

去殼

山梔子

去殼

甘草

炙各半兩

防風

去蘆四兩

右剉碎同蜜酒炒香焙為細末每服三錢水一大盞
煎至七分溫服不拘時候

枳殼丸治脾實心腹壅滯四肢疼悶兩脇脹滿大小便

不利

方見秘結類

橘皮竹茹湯治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓

去皮

陳皮

去白

枇杷葉

拭去毛

麥門冬

去心

青竹茹

半夏

湯泡七次各一兩

人參

去蘆

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去渣
溫服不拘時候

翻胃

安脾散治胃氣先逆飲食過傷或憂思蓄怒宿食痼癖
積聚冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人得

之多由血氣虛損男子得之多因下元冷憊有食罷即吐有朝食暮吐暮食朝吐所吐酸臭可畏或吐黃水凡有斯疾乃是脾敗惟當速療遲則發煩渴大便秘水飲纖悉不得入咽不旋踵斃矣

高良姜

一兩以百年壁上土三合敲碎用水二碗煮乾薄切成片

南木香

草果

麤裏煨去殼

胡椒

白茯苓

白朮

丁香

陳橘皮

湯洗去穰

人參

去蘆各半兩

甘草

炙一兩半

右為末每服二大錢食前米飲入鹽點服鹽酒亦得

薤白粥治翻胃無問久遠冷熱

人參

一兩細切以水一大升煎取三合

雞子

三箇去黃

薤白

二莖

熟稀粟

米粥

右以雞子白及薤白粟等三味熟調攪然後煖人參湯相和更調攪頓服之不限早晚服無忌當時便定准前服萬不失一如思飲食即與粟米粥飲漸漸加粳米和之

熟水草果飲法

烏梅肉

四兩

草果

乾薑

炮各三兩

赤茯苓

二兩

甘草

炙半兩

右剉散每服用半兩水一碗半煎至一碗去滓磁器盛和熟水隨意服之

桂苓散治翻胃發渴

半夏

四錢 桂心

甘草

各三錢

赤茯苓

四兩 澤瀉

四兩

右剉散每服四錢生薑煎服

三稜煎丸治宿食積聚翻吐酸穢

方見諸氣類

正胃散治翻胃嘔逆藥食俱不下結腸三五日至七八

日來大便不通如此者必死之疾

白水牛喉

一條去兩頭節并筋膜脂肉節節取下加阿膠片黑牛不可用須就宰牛人買

下修治好臨病時旋炙修合

右用喉節以好米醋一大盞浸頻翻令勻微火炙乾再蘸再炙醋盡為度存性不得見太陽研為末每服一錢食前用陳米飲調下輕者一服見效

靈砂丹治脾疼翻胃

靈砂

一蚌粉同炒累變兩色二兩

丁香

胡椒

各四十粒

右為末生薑自然汁煮半夏糊圓如梧子大每服三十九翻胃煨生薑湯吞下虛人脾痛炒鹽湯下

青金丹治一切吐逆

水銀

八錢生硫黃

右二件入無油鉚內用慢火化開以柳木篦子撥炒或有烟焰以醋洒之結成砂子再研為細末用米粽尖杵和為圓如菉豆大每服三十九用姜橘皮煎湯送下不拘時服

大掌中金治翻胃服水藥不得者

大綿附一箇生姜自然汁一椀煮乾為度母丁香一箇為末以少許安掌中心舐喫立效

丁香散治翻胃

大附子

一箇切去蓋剝令空入丁香四十九粒以蓋覆之線縛著置銀器中浸以生姜自然

汁及蓋而止慢火煮乾為度

右為末用一錢七糝舌上漱津下若煩渴徐徐食糜
粥忌油膩生冷

大倉圓治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之

陳倉米

一升用黃土炒
米熟去土不用

白豆蔻

二兩

縮砂仁

二兩

右為末用生姜自然汁法圓如梧子大每服一百圓
食後用淡姜湯送下

小半夏圓治翻胃及不忤飲食

半夏

湯洗
十次

胡椒

右等分為末薑汁圓如梧子大每服三五十圓薑湯

下

六丁圓治翻胃如神

五靈脂

醋炙

生辰砂

錢一

母丁香

一兩不見火

右為末入黃狗膽糯米粽子尖為圓如鷄頭大每用姜湯化下

香牛飲治哽噎翻胃吐食神效

先以羯牛用繩掛開牛口以淨布巾抹令口舌淨却拖牛舌出來候有涎出以梳盛之每服用八分蓋為一服研好麝香末一捻打勻却以銀盞盪令溫先以

絹帛束縛中脘胃口令極緊候氣喘乘熱解開隨氣喘一二口便服服時先對病人說煮白粥惱煩之并煎丁香汁和粥服藥罷隨與粥喫

鹽裹圓治翻胃膈氣

丁香 木香 肉豆蔻 縮砂 厚朴 陳皮

胡椒 華撥 沉香 各等分

右為末以大蒜瓣子不拘多少每瓣作二瓣入去殼巴豆一粒用餅藥調麪裹蒜片慢火煨熟去巴豆及

麴只將蒜研成膏將前項藥末一半搜和為圓如梧
子大每服三十圓於鹽內滾過蘿蔔湯調前藥末二
錢吞下神效

溫胃散治翻胃

真附子

一箇去皮臍分作四塊生薑一兩研水
一盞慢火同煮至水盡取附子切焙

右為末每服一錢空服鹽湯下

治翻胃嘔吐便秘結虛冷者用靈砂或養正丹溫而利
之又蘇合香圓用四分感應圓用六分夾研作細圓

薑汁泡沸湯下此亦溫利若大便熱結用蜜煮凝捻作指鉗納後部導之或用獾豬膽一枚取汁入法醋少許以筆蘸滴灌於後部或燒皂角於桶內熏穀道或用連根葱白一握漢椒五十粒搗細作餅焙熟和輕粉掩臍續以葱椒煎湯熏盪身下

又方治翻胃

真蚌粉

右每服二錢薑汁米飲調下

治吐逆不止

真黃丹

四兩研細用米醋半升入銚內煎令乾更以火煨通紅令研細為末

水米飯為圓如梧子大醋醱湯吞七圓不以時服

灸法兩乳下各一寸以瘡為度又灸臍上一寸二十壯
又灸內踝下三指稍斜向前三壯中腕一穴在臍上
四寸足三里二穴在膝下三寸各灸七壯或九壯其
效尤著

導引方除腹肚冷風宿疾積胃口冷食欲進退吐逆不

下正坐兩手向後捉腕反拓席盡勢使腹絃絃上下
七左右換手亦然

乾食方惟食乾飯餅餌盡去羹飲水漿藥亦用圓自不
反動調理旬日奇效有人三世死於胃及至孫收效
此方

咳嗽

風證神朮散治四時瘟疫頭痛項強發熱增寒身體疼
痛及傷寒鼻塞聲重咳嗽頭昏並皆治之

蒼朮

五兩米汁浸一宿切焙

香白芷

細辛

去葉羌活去蘆

川芎

甘草

炙各一兩

右剉散每服三錢水一盞生薑三片葱白三寸煎七

分溫服不拘時候如覺傷風鼻塞為末蔥茶調下

三物湯治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷

頭目痛眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿短氣

方見傷寒陽證類

杏蘇湯治傷風身熱有汗惡風病證挾熱服杏子湯不

得者此藥穩當也

橘紅 紫蘇葉 杏仁去皮 五味子 半夏湯泡七次

桑白皮蜜炙 貝母去皮 白朮炒各一兩 甘草炙半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

人參 荆芥散 治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言語不出咽乾項強鼻流清涕

荆芥穗 麻黃去根節 細辛去土洗 桔梗去蘆炒 陳皮去白

半夏湯洗七次 杏仁去皮 人參 通草 甘草炙各半兩

右判散每服四錢水一盞半薑五片煎八分食後溫服

寒證金沸草散治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已增寒發熱無汗惡寒煩燥或風熱壅在膈間唾黃濁水甚者

咯血

方見傷寒陽證類

加味青龍湯治表有寒邪喘水飲咳嗽急不得睡卧

方見傷寒

通治類

華蓋散治肺感寒邪咳嗽上氣胃膈煩滿項背拘急聲

重鼻塞頭目眩痰氣不利呀呬有聲

紫蘇子

炒

赤茯苓

去皮

陳皮

去

桑白皮

炙

杏仁

去皮尖

麻黃

去根節各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服二錢水一饑煎至七分去渣食後溫服

暑證六和湯治傷暑痰生咳嗽喘滿加麥門冬烏梅煎

就吞消暑圓

方見伏暑中暑類

濕證白朮散治五臟傷濕咳嗽痰涎增寒發熱上氣喘

急

白朮

二兩

五味子

茯苓

各一兩

甘草

一兩半

半夏

四箇洗去滑破

作十

六片

右剉散作十六服每服水一盞半薑五片紅棗二枚

煎至七分空腹服

不換金正氣散治傷濕四肢重著骨節疼痛洒淅咳嗽

厚朴

去皮薑汁製

藿香

去枝土

甘草

炙

半夏

煮

蒼朮

米汁浸

陳皮

去白加木瓜

每藥一兩只用五錢

右等分剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子二

枚煎至八分去渣食前稍熱服忌生冷油膩

傷寒陰證用之

亦效

七情團參飲子治因抑鬱憂思喜怒飢飽等失節致臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿增寒壯熱羸瘦困頓將成癆瘵

人參

紫苑茸

洗阿膠蛤粉炒

百合

蒸細辛

洗去葉土

款冬花

杏仁

去皮尖炒

天門冬

湯洗七次

半夏

湯炮七次

經霜桑葉

五味子

各一兩

甘草

炙羊兩

右判散每服四錢水一盞半生薑五大片煎至七分
去渣食後溫服因氣而嗽者宜加木香欬而唾血有
熱加生地黃欬而唾血有寒者加鍾乳粉因疲極而
欬嗽者加黃耆因損而唾血者加沒藥藕節欬而嘔
逆腹滿不食者加白朮倍加生薑欬而小便多者加
益智仁欬而大便溏者去杏仁加鍾乳粉欬而面浮
氣逆者加沈香相皮煎

分心氣飲治憂鬱得嗽

每服三錢加枳殼去穢一錢北
五味十粒生薑三片煎方見諸

氣類

熱證枳殼半夏湯治上焦有熱咳嗽黃痰痞滿阻食加

防己甜葶馬兜鈴薄荷葉各半兩

每服姜三片桑白皮七寸煎方見痰

飲類

貝母散治熱嗽辰時喫酉時可安兼治痰喘

知母

新瓦上焙

貝母

巴豆七粒同貝母炒畧熟去巴豆不用各一兩

右剉散錫糖一塊同煎服一方以二母為末入巴豆

霜少許臨卧用生姜二片蘸藥夾定細嚼咽下

紫苑膏治同上

枇杷葉 木通 款冬花 紫苑 杏仁 桑白

皮各等分 大黃減半

右如常製為末蜜圓櫻桃大食後夜卧噙化

玉芝圓治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利

人參去蘆 乾薄荷

白茯苓

去皮

白礬

枯過

天南星

米泔浸焙

各三兩 半夏湯洗七次姜汁和作曲六兩

右為末生薑汁煮麴糊圓如梧子大每服三十圓食

後薑湯下如痰盛燥熱薄荷湯下

金沸草散治同上

每服三錢生姜桑白皮烏梅煎就吞服半夏丸方見傷寒陽證及痰瘧類

黃連阿膠圓治肺熱咯血亦治熱瀉

黃連

淨三兩

赤茯苓

二兩

阿膠

炒一兩

右黃連茯苓為末水調阿膠和圓如梧子大每服三十圓食後米飲下黃連茯苓能抑心火肺得其清則嗽止

小柴胡湯治嗽久瘥身有煩熱吸冷水而暫止者加桑

白皮北五味子棗子煎不拘時服煩熱加麥門冬嗜卧

減食加白朮煎

方見傷寒陽證類

洗心散治心熱上炎肺經胸膈滿痛咽乾口燥咳嗽殊

甚

方見積熱類

冷證藿香正氣散寧肺和胃祛痰治嗽通暢三焦進美

飲食生薑三片鹽梅一箇杏仁七粒去皮尖北五味子

七粒同煎就服青州白圓子

方見傷寒陰證風科通治類

理中湯治肺虛咳嗽痰唾清白飲食日減多嘔當溫養

脾土則生肺金用五味子炒阿膠煎湯調服立效

方見脾方

杏子湯治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰飲停

積

人參 半夏 泡 茯苓 細辛 乾薑 官桂

杏仁 白芍藥 甘草 五味子

右各等分剉散每服四錢以水二盞薑四片煎至七分去渣溫服不以時此藥最宜冷嗽熱嗽非所宜若脈浮緊身熱無汗惡風脈浮身熱無汗惡寒而咳加

少麻黃去節熱服

丁香半夏圓治肺胃虛寒咳嗽

方見痰飲類

胡椒理中圓治寒嗽冷痰吐白涎沫續續不止不能飲食

欬冬花

去梗

胡椒

葶藶

陳皮

乾薑

甘草

良薑

細辛

去葉各二兩

白朮

二兩半

右為末蜜圓如梧子大每服十圓溫湯米飲任下不拘時候

黃耆建中湯治冷嗽加半夏麴乾薑五味子同煎空心

服

方見傷濕類

養榮湯治冷極嗽可加熟附子白豆蔻北五味子蜜炙

粟殼蜂粉炒阿膠

方見虛損類以上二方所用各少許

皺肺圓治久嗽

款冬花 人參 五味子 官桂

去皮

紫苑

白石

英

微帶青色者

鍾乳粉

右等分為末用羯羊肺一具去皮尖杏仁半斤水煮

肺爛為度去筋膜與杏仁同研極爛和衆藥圓如梧
子大陰乾每服五七十圓至百圓糯米飲下食後臨
卧服

時行人參飲子治寒熱上壅咳嗽痰涎

人參

苦梗

去蘆

五味子

赤茯苓

去皮

白朮

炒各

一兩

枳殼

炒

甘草

炙各

半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去渣
食前溫服嗽多者加桑白皮一兩痰多加半夏麴一

兩寒暑之交氣盛人衣厚作壅忽痰盛微熱此藥最
宜若作感冒發其汗攻其邪必成大病此方佳處在
赤茯苓能導心熱枳殼能疎肺壅故易效一方有半
夏一兩又云寒壅者加杏仁不去皮尖紫蘇各半兩
一服散治咳嗽

阿膠二片生薑十片

大烏梅二箇

甘草一錢

紫蘇十葉

杏仁去皮

尖七箇

大半夏

三箇炮

罌粟殼

三箇炙

右判散水一盞煎至六分去渣臨卧服

敗毒散升麻葛根湯香葛湯各件每用四錢生薑烏梅

桑白皮煎有效酌量用之

方竝見傷寒陽證及和解類

勞嗽蛤蚧散治虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲食

蛤蚧

一對

人參

去蘆

百部

去心

款冬花

去皮

紫苑茸

各半兩

貝母

阿膠

蛤蚧粉炒

鱉甲

醋炙

柴胡

去蘆

肉桂

去粗皮炒

黃耆

蜜炙

甘草

杏仁

湯浸去皮尖

半夏

生薑汁浸

各一兩

右為末每服三錢水一盞半生薑三片煎至一盞不

拘時溫服肉桂雖去風寒有熱人不肯服則當改用

細辛

風痰嗽白圓子散治一種咳嗽直至嗽頓吐飲食痰物皆出盡方少定此乃肝木尅脾土風痰壅盛宜以青州白圓子方作生料更加少木香丁香橘紅天麻全蝎去毒足僵蚕炒去嘴足服有效

損嗽當歸飲治男子因打損負重女子因勞苦用力而傷肺經肺經既損遇風寒則為咳嗽或咳血或至紫黑宜用此藥去心肺間瘀血仍灸肺腧病即甦

肺腧穴在三椎下兩

傍各一寸半

蘇木 生地黃 當歸 大黃 赤芍藥

右為末酒調服得利去瘀血即止服養榮湯調理
通治澄清飲治諸證痰嗽服他藥不效者

南星 蚌粉 知母 貝母 半夏 白礬

右各等分剉散每服三錢水一大盞生薑五片去渣
澄清俟溫徐徐服食後臨睡服小兒亦用得效

青金丹治肺虛壅咳喘滿咯痰血

杏仁

去皮尖
一兩

牡蠣

煨取粉入杏同炒黃
色去牡蠣粉不用

青黛

一兩

右研勻入黃蠟一兩鎔搜和圓如彈子大壓匾如餅
每日中用柿一箇去核藥在內濕紙裏煨俟藥鎔方
取出去火毒細嚼糯米飲送下一方名甲乙餅治咳
出血片兼涎內有血條不問年久月深但須服一服
效用青黛一分牡蠣粉二錢已杏仁七粒去皮尖研
蠟圓了湯使並同前

人參清肺湯治肺胃虛寒咳嗽喘急胸膈噎悶脇肋脹

滿道塞短氣喜欲飲冷咽噫引痛及療肺痿勞嗽唾血
腥臭乾嘔煩熱聲音未出肌肉消瘦倦怠減食

地骨皮 人參 甘草 阿膠麩炒 杏仁麩炒 桑白皮

知母

烏梅

去核

桔梗

去蘆

罌粟殼

去蒂

益蜜炙

右等分剉散每服三錢水一錢半烏梅棗子各一枚
同煎至一盞去渣食後臨卧加蜜半匙攪勻澄清吸

服效

蠟煎散順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

欵冬花

紫苑

洗土焙乾

甘草

炙各七錢

五味子

炒半兩

桑白

皮炒桔梗

杏仁

去皮炒

紫蘇葉

各一兩

右剉散每服四錢水一盞黃蠟少許煎食後臨卧溫服

神效散治一切喘嗽

用皂角一條作兩邊去子每孔入巴豆一粒線繫定童子小便浸一宿火上炙令焦黃去巴豆不用或入二粒亦不妨却以杏仁半夏各一合入麻油內煎令

折裂為度同為末每服一字乾柿點藥細嚼或用白
米糖蘸喫亦可臨卧時服服了不可喫湯水一應物
妙不可言

朱蘇飲治上膈泛熱咳嗽聲重

方見傷寒
和解類

寧肺散治大人小兒諸咳嗽

玄胡索

一錢
兩半 枯礬

右為末每服二錢用軟錫糖一塊和藥含化小兒一
錢用蜜亦可

杏仁煎治咳嗽失音不出

杏仁

去皮尖
研三兩

生薑汁

蜜

砂糖

各一兩半

桑白皮

木通

貝母

各一兩
一分

紫苑

五味子

各一兩

右剉散用水三升煎至半升入杏仁砂糖蜜薑汁再煎成稀膏每服挑一匙頭含化更加知母款冬花各一兩效

二陳湯治咳嗽嘔痰

方見痰瘡類

款冬花散治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胃膈煩悶

痰實涎盛喉中呀呬鼻塞清涕頭痛眩冒肢體倦疾咽
嗌痛

知母

兩

麻黃

去根節
四兩

桑白皮

洗

半夏

各一

阿膠

蚌粉

炒去粉

貝母

去心麩炒
各四兩

杏仁

去皮尖
麩炒

甘草

燂二

款冬

花

去梗
一兩

右剉散每服水一盞薑三片煎至七分去滓食後溫
服

單方葶藶散治肺壅咳唾膿血喘嗽不得睡卧

甜葶藶

二兩半隔紙炒令紫

右為末每服二錢水一盞煎至六分不拘時溫服

又方治穀氣素壯人久嗽即效粟穀一味淨去筋膜蜜炙為末每服用蜜湯下

又方治羸弱久嗽屢效九尖拒霜葉為末用魚鮓蘸服又方治久嗽漸成癆瘵鳳尾草為末用魚鮓蘸服即效嚼藥防已散

薄荷 百藥煎 枯礬 防已 甘草

右剉散入口細嚼旋旋嚥下治熱嗽失聲有效

星砂圓治一切風痰利胃膈壯脾胃及消痰積溫中順氣內傷生冷腹脇脹痛酒後痰實嘔吐服之神效

南星

四兩湯洗七次

良薑

縮砂仁

各一兩

香附子

二兩炒去毛

右為末生薑自然汁煮麴糊為圓如梧桐子大每服三十圓生薑湯下不計時候夏月傷生冷尤宜服捷徑方治久病痰嗽百藥未效

橘紅

一斤去白要陳久者

甘草

鹽

各四兩

右用水五盞慢火煮煎藥焙乾為末白湯點服

滴油散治痰嗽面浮

箕蚌粉一味新瓦炒令通紅地上出火毒拌青黛少許同淡薑水滴麻油數點服即愈

灸法上氣欬逆短氣胸滿多唾唾惡冷痰灸肺腧五十壯又法灸兩乳下黑白際各百壯即瘥咳嗽咽冷聲破喉瀆瀆灸天突五十壯穴

與灸喘急同

膏肓腧在四椎

下五椎上各去脊三寸近胛骨僅容一指許多灸之

亦效

喘急

風證麻黃散治傷風喘急坐卧不安痰涎壅塞涕唾稠

粘手足冷痺

麻黃

去根節
十兩

肉桂

去皮六兩
不見火

款冬花

三兩去
蘆枝梗

訶子

皮

五兩

甘草

燂五兩

杏仁

三兩去皮
尖麩炒

右剉散每服三錢水一盞半入好茶一盞煎至八分

食後夜卧通口服如半夜不能煎但以藥末入茶和

勻沸湯點或乾嚙亦得忌魚酒炙烤猪肉腥臊等物
溫肺湯治肺虛久感風邪喘咳不能坐卧不思飲食

白芍藥

二兩

五味子

去核炒

乾薑

炮

肉桂

去粗皮

半夏

熬熟焙

陳皮

去白

杏仁

三兩

甘草

炒各二兩

細辛

去蘆葉

各二兩

右判散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹帛捫
汁食後服兩服渣再煎一服一方去芍藥細辛可加

減用

金沸草散治肺熱傷風喘嗽痰實

方見咳嗽類

寒證加味子拘湯治肺感寒邪發喘

杏仁

去皮尖
七錢半

陳皮

一兩
半

甘草

三錢
半

麻黃

一兩
二錢

北五味

子

七錢
半

棘桂

五錢
半

右判散每服四錢水一盞半生薑三片煎喘甚加馬

兜鈴桑白皮夏月減麻黃

香葛湯參蘇飲素有熱者宜服此

方見傷寒
和解類

藿香正氣散治渾身拘急增寒喘嗽頭目昏重加北五

味子杏仁去皮尖鹽梅煎有泄不用杏仁

方見傷寒
陰證類

七情四磨湯治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 檳榔 沈香 天台烏藥

右各濃磨水和作七分盞煎三五沸稍溫服或下養

正丹黑錫丹

四七湯治驚憂氣遏上喘

半夏製二兩半 茯苓二兩半 厚朴製一兩半 紫蘇葉一兩

右剉散每服三錢半薑七片棗二枚煎服

紫蘇子湯治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩惡

腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脈虛緊而濡

紫蘇子

一兩

大腹皮

草果仁

半夏

湯洗七次

厚朴

去皮

薑汁製

木香

不見火

陳皮

木通

白朮

枳實

炒去穢

人參

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分

不拘時

熱證洗心散治心肺俱熱致胸滿壅盛口乾作渴發喘
滿中噎氣每服二錢薄荷茶清調下

八正散治同前用燈心二十莖淡竹葉一皮煎

方強見
積熱類

葶藶散治過食煎燂或飲酒過度致肺壅喘不得卧及

肺癰咽燥

甜葶藶

炒

桔梗

去蘆

瓜蒌子

川升麻

薏苡仁

桑白皮

炙

葛根

各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片同煎食後溫

服

小柴胡湯治服熱藥過多或身有煩熱作喘數服即安

方見傷寒
陽證類

金沸草散加甜葶藶桑白皮煎

方見傷寒
陽證類

枳殼半夏湯加防己薄荷煎

方見痰飲類以上
二方所加各半兩

加味控涎圓治風熱上壅或中脫停留水飲喘急治四肢浮腫脚氣入腹平常腹中痰熱諸氣結聚服之得利則效

大戟

芫花

甘遂

甜葶藶

巴豆

去殼各
一兩

黑牽牛

三兩炒
取頭末

白芥子

炒二
兩

右為末米糊圓粟米大每服三七粒茶清吞下或溫水亦可服後未可服甘草藥及熱水

虛證蘇子降氣湯治氣虛發喘不得安枕宜用舊鹽梅

杏仁去皮尖北五味子各少許煎吞黑錫丹五十粒

方見

諸氣及
癰冷類

鍾乳圓治喘嗽痰涎稠粘晝夜不止不能坐卧遠年日近並皆治之

滑石兩鍾乳粉

半兩見成者

南星

炮切片
生薑製

右為末煮乾柿去蒂核搗細搜藥為圓如梧子大每

服四十圓薑棗煎湯下氣弱人更服養正丹

方見痢冷類

四物理中圓治肺胃受冷氣短減食時吐痰水喘促濃

煎人參湯吞服甚妙

方見咳嗽類

安腎圓治腎寒多唾上喘人參鹽湯下八味圓亦可

方並

見虛損類

養正丹均有效

方見痢冷類凡動仆喘甚者均宜服效

紅椒圓治虛勞喘嗽眩暈

靈沙

一兩細研

人參

木香

各二錢半

大香附子

并碎

大紅椒

去合口并子焙
出汗各半兩

右為末糕糊圓如麻子大每服二十圓空心橘皮湯

下

通治人參定喘湯治肺氣喘喉中有聲坐卧不安胸膈
緊滿及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參

去蘆
一兩

罌粟殼

蜜炙
二兩

麻黃

去節
半兩

夏麴

甘草

炙
各

一桑白皮

半兩
兩

阿膠

炒一兩
兩

五味子

一兩
半

右剉散每服三錢水一盞薑三片煎至七分食後溫

服

九寶湯治經年喘嗽通用常服屢效

麻黃

去節

橘紅

腦荷

各一兩

辣桂

紫蘇

桑白皮

炒

杏仁

去皮尖

大腹子

連皮

甘草

炙各半兩

右剉散每服三錢薑五片烏梅一箇水一盞半同煎

食後臨卧服或入童子小便半盞尤妙

杏參飲治因墜墮驚恐或渡水跌仆疲極筋力喘急不

足

人參 桑白皮 橘紅 大腹皮 檳榔 白朮

訶子

麤裏蝦取肉

半夏

湯炮七次

桂心

不見火

杏仁

去皮尖炒

紫苑

甘草

炙

右等分剉散每服四錢水一盞半生薑五片紫蘇七葉煎至七分去滓溫服不拘時候

分心氣飲治氣逆脈伏發厥而喘者

方見諸氣類

秘肆降氣湯治氣不升降上熱下冷作喘生薑紫蘇葉

同煎就服玉華白丹效

方見諸氣類玉華白丹方見痢冷類

加味白朮散

陳皮 半夏 人參 白茯苓 白朮 甘草 炙

山藥

炮各二兩

白扁豆

製一兩半

縮砂

桔梗

炒

石蓮肉

薏苡仁

各一兩

右剉散治喘嗽每遇飲酒必發生薑桑白皮煎服效

水煎木香丸治喘急泄瀉加官桂生薑煎服

方見下利類

神保丸治久喘胸膈滿悶飲食不進每服七丸生薑柿

蒂湯下

方見諸氣類

玉液散治久近喘嗽口乾作渴

枯樓根

知母

貝母

去心炒
各一兩

甘草

炙半兩

人參

半兩

右末每服二錢先鎔下黃蠟二錢同入米飲調下食後服

神應丹治肺氣喘急晨夕不得睡不問久新一服見效

砒石

一兩
菜豆錢六

右二味同煮以豆爛為度取出砒石入黃丹一兩同研爛用紙做卷五七重如竹筒又入砒石黃丹以黃

泥固濟復燒紅為度又入黃丹一兩麪四分為圓如粟米大又以黃丹二兩為衣每服二粒新井花水下得效即止

胡桃湯治痰喘

胡桃肉

三箇生薑三片

右臨卧食畢飲湯三兩呷又再嚼如前飲湯就被即安

葶蘆圓又名防己圓大治肺氣咳嗽面浮目腫喘促睡

卧不得步履艱難小便赤澁等疾

漢防己

貝母

煨令微黃

木通

各一兩

甜葶藶

隔布炒令紫色

杏

仁

去皮尖及雙仁麤炒微黃細研各二兩

右為末棗肉為圓如梧子大每服三十圓煎桑白皮

湯下不拘時候

炙肝散治喘併痰嗽兩服病不復作

白礬

飛過研

五倍子

為末

右每服各一錢以生猪肝火上炙熟蘸藥食後臨卧

服

人參清肺飲治喘急噎塞加桔梗欬冬花

方見咳
嗽類

清膈散治喘嗽吐唾不利膈熱口中苦氣

南星

一兩

鉛白霜

少許

桑白皮

一兩半

白附子

五錢

右剉散生薑三片煎食後臨睡服

灸法肺腧各十一壯穴在第三椎下兩旁各去一寸五分天突穴在頸結喉下五寸宛宛中灸七壯立效

泄瀉

風證香薷香蘇散治傷風自汗飧泄每服四錢生薑木

瓜煎服

方見傷寒和
解及傷暑類

不換金正氣散體虛傷風冷瀉加官桂烏梅

方見時
疫類

胃風湯治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉注下膈
中虛滿大腸受濕下如豆羹汁或下瘀血日夜無度並
宜服

人參

白茯苓

去皮

芎藭

桂心

不見火

當歸

白芍

藥

白朮

炙火

甘草

炙

右等分剉散每服四錢水一盞半入粟米百餘粒煎至七分去滓空腹稍熱服胃氣弱者不宜多服

火炊丸治風氣行於腸胃泄瀉

火炊草一味為末醋糊丸每服三十九空心服

寒證風下湯治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒泄瀉青黑兼治傷寒挾寒而利臍下冷名驚瀉證效

人參 白朮 乾薑 炒 甘草 炒各一兩 茯苓 厚朴 薑製

各二兩

右判散每服三錢水一盞煎空心服

加味治中湯治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒泄瀉

乾薑

炮

白朮

炒

青皮

去白

陳皮

去白

縮砂仁

各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右判散每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時或兼進感應圓

暑證香薷散治傷暑煩渴引飲所下如水

方見傷暑類

胃苓湯治傷暑煩渴引飲所下如水

五苓散

方見傷暑類

平胃散

方見脾胃類

右二錢合和紫蘇烏梅煎湯下未效加木香縮砂白

朮丁香煎服來復丹亦可

方見痢冷類或感寒濕水泄平胃散理中湯蘇梅米

湯調下

通來散分利水穀解煩熱止泄瀉

猪苓

去皮

白朮

去蘆

澤瀉

去毛

赤茯苓

去皮

車前子

木通

茵陳 瞿麥

右剉散每服四錢水一盞半燈心麥門冬煎服

六和湯治暑瀉小便赤澁

方見傷暑類

水浸丹治感暑口乾煩渴頻瀉

方見霍亂類

濕證藿香正氣散治腰脚冷痺小便自利肢體重著所

下黃黑

方見傷寒陰證類

胃苓湯治傷濕瀉每服二錢蘇葉三皮食鹽少許調熱服

白朮附子湯治腸胃虛受濕腸鳴泄瀉自汗

白朮

二兩

附子

炮

茯苓

去皮各一兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

麴芩丸治臟腑受風濕泄瀉不止

芩窮 神麴 白朮 附子

各等分

右為末糊圓如梧子大每服五十九丸米飲下

七情加味藿香正氣散治飲食中憂怒傷脾腹內膨脹吐瀉頻併或作晨泄加丁香縮砂良薑南木香各半錢生薑三片紅棗一枚煎效

木香散治臟寒冷極及久冷傷敗口瘡下泄米穀不化
飲食無味肌肉瘦痺心多嗔恚婦人產后虛冷下泄及
一切水瀉冷痢

木香

破故紙

各一兩

良薑

砂仁

厚朴

薑製各三分

赤芍藥

陳皮

肉桂

白朮

各半兩

胡椒

茱萸

各一分

肉豆蔻

四餘

檳榔

一箇

右為末每服三大錢用不經水猪肝四兩批薄重重
糝藥漿水一碗入醋茶脚少許入甑蓋覆煮熟入鹽

葱白三箇生薑彈子大同煮欲盡空心作一服冷食之初微澹不妨此是逐下冷氣少時自住經年冷痢滑泄只是一服渴則飲粥湯忌冷油膩如不能食冷則漿水煖食之若只用漿水煮猪肝為圓如梧子大每服五十九用粥飲下亦效若暴瀉只一服

熱證黃連香薷散治熱瀉澹利大便熱煩燥小便赤喜飲冷香薷散每一兩加宣連五錢剉碎合和燈心二十

莖車前草二根同煎

方見傷暑類

五苓散治法湯引同上

方見傷暑類

黃連阿膠丸每服五十丸米飲下空腹服

方見咳嗽類

升麻葛根湯小柴胡湯治傷寒身熱目疼煩渴泄瀉二

藥和合用生薑陳米烏梅煎服立效

方並見傷寒陽證類

藥皮湯治挾熱泄瀉亦治血痢

藥皮

三兩

黃芩

二兩

黃連

一兩

右剉散每服四錢水一大盞煎至七分入阿膠末半

錢再煎少頃溫服

調胃承氣湯治大實熱下利譫言此有燥屎也夫泄瀉反用大黃者乃因所利而利之此治熱瀉也非大實勿

妄輕用之

方見傷寒陽證類

冷證去麻黃五積散炒過名和氣飲治脾胃宿冷腹內切痛或外感風寒內傷生冷泄瀉黃白色不止或肝經受寒面色青慘厥而泄利生薑三片鹽梅一箇紅棗二

枚同煎大效

方見傷寒陰證類

豆附九治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄

瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻

炮四兩

木香

二兩不見火

白茯苓

四兩

乾薑

炮四兩

附子

炮去皮臍

肉桂

去粗皮二兩

丁香

一兩不見火

右為末薑汁糊為丸如梧子大每服五十圓加至一百圓薑湯吞下粥飲亦可空心食前服

薑附湯治下泄如水或青或白臍腹痛手足冷脈細欲絕漸漸短氣由陽氣暴絕為陰所迫則注下不止陽復則生不復則死又不止灸氣海百壯傷寒虛證驚澹亦

效

方見大方科
中寒類

太已寒九治沈寒痼冷臟腑虛憊心腹疼痛脇肋脹滿
泄瀉腸鳴自利自汗久痢休息

華撥

肉桂

各四兩

乾薑

炮

高良薑

各六兩

右為末煮麴糊圓如梧子大每服三十圓空心米飲
下

加味四柱散治臟腑虛怯本氣衰弱脾胃不快不進飲
食時加泄利晝夜不息

人參

去蘆

白茯苓

去皮

附子

炮去

皮臍

各一兩

木香

濕紙包

煨過

訶

子

濕布包炮取皮用各半兩

右判散每服二錢薑三片棗一枚煎至六分服

加味三建湯治洞泄不止

大川烏

綿附

天雄

三味並炮鹽水浸去皮臍

木香

肉豆

寇

煨裂

訶子

去核各一兩

右判散每服三錢生薑十片紅棗二枚鹽梅一箇陳

米一撮同煎空腹熱服未效仍服來復丹

來復丹治同上

方見痢冷類

茱萸斷下圓治臟寒腹痛泄瀉不止

艾葉

炒

赤石脂

川薑

各半兩

吳茱萸

炒二兩半

縮砂仁

肉豆蔻

附子

炮去皮臍各七分

右為末麴圓如梧子大每服五十圓食前米飲下
豬臟圓治臟寒泄瀉不進飲食氣體倦怠

吳茱萸

淨去枝梗不以多少用水浸透

右用獐豬臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸入臟內兩

頭扎定慢火煮令極爛用甑蒸熟尤好將二味於白
內杵千下令極細圓如梧子大每服五十圓米飲下
猪肚圓治臟寒泄瀉先用製成厚朴附子二味生薑棗
子煎服空心仍服此猪肚圓

川烏

附子

炮各二兩

乾薑

炮

白朮

厚朴

各一兩半

良薑

炒

肉豆蔻

煨

華撥

禹餘糧

火煨醋碎

縮砂仁

丁香

桂心

各一兩

右為末用猪猪肚一隻淨洗以川椒一兩去目茴香

一兩大麴二兩入猪肚內用線縫定酒醋煮爛取出
川椒茴香大麴焙乾為末均和煎藥以猪肚杵和得
所為圓如梧子大每服五十圓空心米飲送下

椒艾圓治臟腑虛寒泄痢不止

烏梅

去核二兩半
醋浸布裏蒸

揉成無滓艾

一兩半

川椒

炒去
目乾

薑

赤石脂

黑附

炮製各
一兩

右除烏梅外同為末將蒸過烏梅肉研勻更入熟棗
肉蜜少許和圓如梧子大每服二十圓米飲下

茱萸湯治脾泄多老人腎虛謂之水土同化

吳茱萸

取淨不以多少

右用白水煮去滓入鹽少許通口服蓋茱萸能煖膀胱水道既清大腸自固餘藥雖熱不能分解清濁也大理中圓治大便虛滑不禁每一圓用平胃散一貼煎化服便止加鹽梅同煎尤妙

人參

白朮

乾薑

甘草

各等分

右為末煉蜜圓如指頭大每服十圓米飲下

六君子湯治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食腸鳴泄瀉

人參 甘草 白茯苓 白朮 肉豆蔻

濕帝裏煨熟剉

碎以厚帝盛壓去油訶子煨去核各等分

右剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎服或為末
熱鹽湯調服亦可

養氣丹治久冷泄瀉及休息痢疾每服三十圓空心米

飲吞下多服收功

方見痢冷類

冷熱不調參連圓治腸胃虛弱冷熱不調泄痢腸鳴日

夜無度

艾葉

用糯米糊拌勻焙取細末秤二兩半

乾薑

炮取末二兩用艾末米醋升半慢火熬成

膏

宣連

一兩半剉如麻豆大用吳茱萸兩半同黃連炒色紫揀去茱萸不用

訶子

去

核一

木香

一兩半別用黃連一兩半為粗末將木香泡水一升慢火煮盡水去黃連不用

切焙

人參

去蘆白朮

烏梅

去核焙乾秤

百草霜

別研

白茯苓

苓

去皮

酸石榴皮

炒

當歸

洗焙各一兩半

地榆

一兩

赤石

脂

一兩三分

龍骨

一兩三分火煨

阿膠

二兩蚌粉炒

罌粟殼

二箇蜜炙

右為末將前項艾膏和為圓如梧子大每服五十圓

陳米飲下

戊己圓治脾胃不足濕熱泄瀉不止米穀不化腸鳴腹痛

黃連 白芍藥 吳茱萸

泡七次
焙乾

右等分為末用糊圓如梧子大每服三四十圓空心
食前濃米飲下

腎泄安腎圓治腎洩腹痛無定處似痢非痢骨痛面黃
腰脚時冷用七氣湯送下安腎圓

方見虛
損類

七氣湯

見心
痛類

震靈丹治同前每服三十圓炒破故紙棗子煎湯調鍾乳粉少許空心送下小兒腎洩白膿褐汁面黯齒脫畏人怯寒震靈丹末入些鍾乳粉以棗煎炒破故紙取熟汁調下效

方見痢冷類

金鎖正元丹治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛

冷之證並皆治之

方見痢冷類

脾泄炙肝散治久患不愈

白朮 白芷 白芍藥 桔梗

右等分為末炙鹽肝蘸服

和氣散即除麻黃五積散治久虛脾泄大效

方見傷寒陰證類

朴附圓治脾元虛弱久患脾泄冷瀉不止及翻胃惡心

臟腑滑泄

厚朴

去粗皮薑汁製一兩

綿附子

炮去皮臍淨一兩

神麴

炒五錢

乾薑

炮三兩

右為末酒煮麴糊圓如梧子大每服三十圓空心食

前米飲或鹽湯下

脾腎泄木香散治脾胃俱虛泄瀉

肉豆蔻

麩裹
帝煨

破故紙

炒

白朮

白茯苓

各半
兩

木香

甘草

炙各
七錢

右剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎食前溫服
二神圖治脾胃虛弱泄瀉不止全不進食

肉豆蔻

二破故紙

四兩
炒熟

右為末用肥棗四十九箇生薑四兩切片同煮棗爛
去薑取棗剝去皮核用肉研為膏入藥和杵圓如梧

子大每服三十圓鹽湯下立效弱甚加茯苓二兩木

香一兩

積證香蘇散治食傷脾胃噫生熟氣及所泄穢氣殊甚

或腹緊塊痛水煎吞盧氏感應圓每服三七粒立效久

患食積泄瀉不止經驗

方見傷寒和解及諸積類

縮砂香附湯治傷食成積下瀉與平胃散合和每服二

錢紫蘇葉食鹽煎湯調常服有效

方見諸氣及脾胃類

酒泄虛者香茸圓治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但

再飲一二盞泄作幾年矣

嫩鹿茸

草火燎去毛酥炙黃

肉豆蔻

火煨

生麝香

另研

右為末白陳米飯為圓如梧子大每服五十圓空腹

米飲下熱者酒蒸黃連圓

方見下痢類

平胃散專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂麥芽神麴各五錢為末空腹米飲調二錢立愈

晨泄又名瀉泄香薑散

生薑

四兩切如豆大

黃連

二兩剉

右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃連末
每服二錢用臘茶清調一劑而愈又用米飲酒調治
白痢尤妙若欲速效一料只作二服

然、五味子散治五更天明溏泄一次名腎虛泄感陰氣而

五味子

揀去梗
二兩

吳茱萸

半兩

右同炒香熟研為末每服二錢用陳米飲調下食前
空腹服或加破故紙炒香肉豆蔻煨裂為末蒜膏為

圓如梧子大每服三十圓米飲下大效

滑泄大斷下圓治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脈細皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗耗則氣奪由穀氣不入胃胃無主以養故形氣消索五臟之液不收謂之五虛此為難治畧能食者生

附子

炮

肉豆蔻

牡蠣

煨

秤各一兩

細辛

乾薑

炮

良

薑

白龍骨

赤石脂

酸石榴皮

醋

煨乾各一兩

為度

半

白礬

枯

訶子

去核各一兩

一兩

右為末糊圓如梧子大每服三十圓粟米湯下

豆蔻飲治滑泄神效

陳米

一兩

肉豆蔻

麩裹煨

五味子

赤石脂

研各半兩


右為末每服二錢粟米湯飲調下日進三服

乳豆圓治滑泄不止諸藥無效

肉豆蔻

生為末

右以通明乳香用酒浸透研成膏和前藥末為圓如梧子大每服五十圓空腹飯飲下



世醫得效方卷五

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷六

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣杜三泰

欽定四庫全書

世醫得效方卷六

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

下痢

風證神木散治胃經傷風自汗小便難下痢

方見咳嗽類

露宿湯治風痢純下清血

杏仁

七個
去皮尖

苦木瘡

一掌

烏梅

二個

草果 一个

酸石榴皮 半皮 青皮 二个

甘草

右剉散作一劑水二碗生薑叁片煎土分露星一宿
次早空腹服

間風湯治法藥件

並見泄瀉類

寒證人參敗毒散治寒邪壯熱下痢及所下似痢非痢
似血非血色如濁酒者加陳米百粒煎

方見傷安陽証類

不換金正氣散治臟腑受寒下痢赤白加烏梅陳光煎

方

見時疫類

暑證六和湯治冒暑伏熱致成痢疾煩渴小便赤澀方

見傷暑類

五苓散治同上能分陰陽利水道方見傷暑類

藥皮湯治暑痢方見泄瀉類

酒蒸黃連圓治伏熱瀉痢不止用香薷散燈心二十莖

車前草二根煎吞服立效方見後面及傷暑類

濕證加味除濕湯治一身盡痛重者浮黃下痢如豆豉

汁

半夏麴

厚朴

去麁皮
薑汁制

蒼朮

炒各一兩

藿香葉

陳皮

炒

茯苓

各五錢

粉草

宮桂

木香

各三錢

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎服空心仍以五苓散兼服利其小水

艾薑圓治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

乾艾葉

四兩炒焦存性

川白薑

一兩炮

右為末醋煮麪糊圓如梧子大每服三十圓溫米飲

下

苦散治脾受濕氣泄痢不止米穀不化

黃連

去鬚判如豆

吳茱萸

白芍藥

判如豆各二兩同炒令赤色

右判散每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

熱證小承氣湯治下痢赤黃但煩飲冷小便不利得熱則極心煩燥喜渴先服一二服蕩之須審是實熱方可
次用

五苓散加車前子以利小便黃連阿膠圓佐治之即效

方見傷暑及咳嗽類

小柴胡湯治下痢赤白心中煩燥潮熱加赤芍藥地榆

麥門冬淡竹葉煎效

方見傷寒陽証類

敗毒散治同上加陳米煎

方見傷寒陽証類

烏梅圓治下痢純血臍腹絞痛脈急大數由腸胃久虛
或先經下血痢未止服熱藥蘊毒伏熱滲成血痢

烏梅

二兩焙

黃連

三兩

茱萸

酸石榴皮各一兩

右為末醋糊圓如梧子大每服三十圓米飲湯下更

以意加減服

地榆散治熱留腸胃下痢鮮血亦名潑火散

方見傷暑類

藥皮湯治熱證發熱下痢

方見泄瀉類

芍藥藥皮圓治一切濕熱惡痢頻并窘痛無問膿血並

宜服

芍藥

黃藥各一兩當歸

黃連

各半

右為末水圓小豆大溫水下三四十圓無時候及夜五六服忌油膩脂肥發熱等物熱痢大效

三黃熟艾湯治傷寒四五日大下熱痢諸藥不止宜服此除熱止痢亦作圓子熟水吞下四十圓治時行毒痢良驗

黃芩

黃連

黃蘗

各二分

熟艾

右剉散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

酒蒸黃連圓治身熱下痢鮮血煩燥多渴或傷熱物過

度

黃連

一斤
去鬚

好酒

二斤半

右用酒浸瓦器盛置甑上蒸至爛取出曬乾研為末
用麪糊為圓如梧子大每服三十圓熟水吞下又療
傷酒過多臟毒下血大便泄瀉用溫米飲下食前一
日兩服

白頭翁湯治熱痢下血連月不瘥

白頭翁

二兩

黃連

黃蘗皮

秦皮

各三兩

右剉散每服四錢水一盞半煎至八分不拘時溫服
冷證當歸圓治冷痢淒清腸鳴所下純白腹痛不止手
足冷者宜服之

當歸

白芍藥

附子

炮

白朮

乾薑

炮

厚朴

製炒

阿膠

粉炒
各一兩

烏梅

二兩

右為末醋糊圓如梧子大每服五十圓米飲吞下空

心服腹痛甚加桂半兩小便不利加白茯苓一兩

大凡痢疾雖體寒手足逆冷冷汗自出六脈沉伏不宜輕用附子多因伏暑而得此疾亦有冷汗自出四肢逆冷六脈虛弱但背寒面垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴引飲此伏暑證也小柴胡湯五苓散酒蒸黃連圓必能奏效學者宜審思耳

方見傷寒陽証傷暑類及見類

水菴木香圓治純下白痢及淡紅黑痢

罌粟殼

二兩去蒂毫

訶子肉 六錢 乾薑 四兩

木香

青皮

陳皮

甘草

各二錢

當歸

白芍藥

各半兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓熟水空心服

豆蔻散治脾虛腸鳴

大肉豆蔻

一枚剉小孔子入乳香三小塊
在內以麴裏煨麴熟為度去麴

右為末每服一錢米飲調下

附子理中湯正理中湯加炮附子每料一兩 朮附湯

薑附湯治同上

方見霍亂中濕中暑類

玉華白丹治臟腑久虛下痢空心米飲下渴者人參湯下亦治腸風下血

震靈丹橘皮煎圖治同上

方並見痢冷及虛

鍾乳健脾圓治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃冷滯飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止又治腸虛積冷清痢清穀或下純白腹中疝痛及久痢赤白腸滑不禁少氣羸弱不思飲食並宜服之

由桂

去麋皮

人參

去蘆

黃連

去鬚

乾薑

龍骨

各二兩

蜀椒

去目及閉口者微炒出汗三兩半

當歸

去蘆

大麥蘖

炒

石斛

去根各一兩

附子

炮去皮臍五月

茯苓

去皮

細辛

去苗土

神麴

炒

赤石脂

各一兩

鍾乳粉

一兩半

右為末入鍾乳粉和勻煉蜜為圓如梧桐子大每服

三十圓食前溫米飲下日三服

未効用三建湯吞金粟黃芽丹數粒方見

病冷類

木香散治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍

下痢痛腹中雷鳴及積寒久痢腸滑不禁

藿香葉

洗焙
四兩

赤石脂

附子

去皮臍醋煮
切焙各一兩

丁香

當歸

去蘆
焙

肉豆蔻仁

木香

甘草

炙
各二兩

訶子皮

一兩半

右剉散每服三錢生薑三片棗子二枚煎空心溫服
五積散治內傷生冷下痢加縮砂木香製粟殼炒阿膠

大效

方見傷寒陰証類

椒艾圓治虛寒下痢不止

方見泄瀉類

四注散治下痢又復洩瀉耳鳴手冷腹痛加木香生薑
棗子粟米煎就後後藥方見泄瀉類

赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴
及冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛遍數頻多脇肋虛滿
胸膈痞悶肢體困倦飲食減少

赤石脂

甘草

炙各一兩
二錢半

肉豆蔻

麩裏煨令
熟十兩

縮砂仁

五兩為末二錢
一粟米飲調

冷熱不調下痢真人養臟湯

香連圓治同上

二兩並洩瀉類

駐車圓治同上

方見後並已上三方用皆立効

氣痢牛乳治氣痢泄如蟹渤

華撥

二錢

牛乳

半升

右同煎減半空腹服効

木香流氣飲治同上

方見諸氣類

五膈寬中散治同上

方見五膈類

異香散治憂鬱氣滯不散腹中膨滿刺痛下痛不止

蓬莪茂

煨

益知仁

甘草

炙

京三稜

煨 各六兩

青皮

去白

陳皮

去白 各三兩

石蓮肉

一兩

厚朴

薑汁浸炒 二兩

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗一枚鹽一捻煎七分通口服不計時或鹽湯鹽酒亦可

木香勻氣散治氣痢腹痛經驗

方見諸症類

積痢治食積下痢腹內緊痛不進飲食鹽梅湯或米飲多服廬氏感應圓或用蘇合香圓和圓仍用平胃散五

苓散二末藥鹽湯空心服調理立安

方見積中氣脾胃傷暑類

蠟匱圓又名靈妙圓治痢止水瀉

硃砂

研一分

辰砂

研一分

巴豆

去殼

黃蠟

半兩

右以二砂為末外將巴豆黃蠟銀石器內重湯煮一
伏時候巴豆紫色為度去十四粒將七粒與貳砂末
同研極勻再鎔蠟匱藥每旋圓如棗豆大每服三粒
至五粒水瀉生薑湯吞下白痢艾湯赤痢烏梅湯五
更空心時服服畢一時不須喫食臨卧服尤佳

禁口痢敗毒散治心煩手足熱頭痛此乃毒氣上衝心
肺所以嘔而不食每服四錢水一盞半陳倉米一百粒

薑三片棗一枚煎溫服

方見傷寒陽証類

加料參苓白朮散治禁口痢食飲不下棗湯調效

方見脾胃

類

又方用石蓮肉留心為末陳米飲下

又方治心腹虛膨手足厥冷或飲過苦澁涼劑晨朝未

食先嘔或聞食即吐不思飲食此乃脾胃虛弱山藥一

味判如小豆大一半銀石器內炒熟一半生用為末米飲調下自獲其功

煨即魚方治禁口痢

鯽魚撚去膽與腸肚入白礬一大豆許同煨熟入鹽醋喫不過兩枚與痢俱效

休息痢加味養臟湯加炮附子青皮烏藥茯苓各五錢治傷酒肉炙燂後發為痢疾休作無時名曰休息生薑

三片紅棗二枚煎

方見泄瀉類

神效散治休息痢氣痢膿血不止疼痛困弱

當歸

焙

烏梅肉

黃連

右等分為末研大蒜成膏為圓如梧子大每服二三
十圓厚朴湯下一方加阿膠

炒五積散治同上生薑三片紅棗二枚鹽梅一箇木香
半錢煎

方見傷寒陰証類

駐車圓治冷熱不調下痢赤白日夜無度腹痛不可忍
者及治休息痢下大效痢方之魁

黃連

去鬚
六兩

阿膠

蛤粉炒
三兩

當歸

去蘆洗
焙三兩

乾薑

炮
二兩

右為末醋煮米糊圓如梧子大每服五十圓加至七十圓空心米飲下

秘方養臟湯治同上

方見後

大巴寒圓虛冷者效

方見泄瀉類

薑苓圓止休息痢大效

乾薑

炮

建茶

各一兩

右以烏梅取肉圓如梧子大每服三十圓食前米飲

下

毒痢茜根圓治毒痢及蠱注下血如豚肝心煩腹痛又
脈或大或小浮焰而起下血如豚肝五內切痛此因服
五石湯圓逼損陰氣甚則其血自百脈經絡而來注下
成蠱毒此為難治

茜根

川升麻

去蘆

犀角

地榆

黃連

當歸

去蘆

枳殼

去穰

白芍藥

右等分為末醋糊圓如梧子大每五十圓米飲空心

下

魚鮓湯治痢下五色膿血或如爛魚腸並無大便腸中攪痛不可忍呻吟叫呼聲聞於外

粉霜

研

輕粉

朱砂

砂

硃砂

研去砂石

白丁香

各一錢

乳香

半錢

巴豆

二十个去殼不去油

右為末蒸棗肉為圓嬰孩三圓如粟米大二三歲四五歲如麻粒大每用三四圓並旋圓煎鮓湯吞下仍間服調胃藥此證緣久積而成故小兒多有之

蠱症痢羚羊角圓治下血黑如鷄肝色相似時發渴者

羚羊角

一兩半

黃連

二兩

白茯苓

一兩

黃柏

去黑皮
一兩半

右為末煉蜜圓如梧子大每服五六十圓蠟茶送下
病危者復生若血鮮滑泄不固欲作厥狀此藥不可
服當灸臍下氣海關元貳穴更服玉華白丹

方見痼

冷類

人參

綿附

炮去
皮臍

肉豆蔻

微火煨裂

右判散每服二錢水盞半生薑七片棗二枚煎食前服

腹痛不止薑茶方治痢下腹痛肚皮熱手不可近

右用生薑切碎如粟米大草茶相等煎服效又方煮

茶白痢用蜜赤痢用薑

未效用真人養臟湯再加楊芍藥常歸立止方見泄瀉類

香連圓治冷熱下痢腹痛甚肛門所泄皆熱

方見泄瀉類

木香勻氣散治宿冷不消氣滯腹痛用紫蘇湯調下未

效用乳香沒藥湯調服

方見諸病類

瘧痢六和湯治夏月冒暑瘧痢俱作瘧則間日而寒戰
掉煩燥難禁當發瘧之時痢或暫止痢則腹痛晝夜頻
數又胸滿乾嘔食藥莫下以此藥治之用生薑三片烏
梅一個紅棗二枚麥門冬二十粒去心煎仍間服香連
圓米飲下未效用五苓散消暑圓仍多服加減清脾更
用勝金圓繼之

方見傷暑泄瀉中暑痰瘧類

痢風加味敗毒散治痢手足拘攣疼痛加檳榔木
瓜虛人五積散合和生薑紅棗煎

方見傷寒陰証

類

大防風湯祛風順氣活血脉壯筋骨逐寒濕逐冷氣又
治患痢後脚痛瘕不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛
脾脛枯腊但存皮骨拘攣跼卧不能屈伸名曰鶴膝風
服之氣血流暢肌肉漸生自然行履如故

熟乾地黃

湯

白木

各二兩

羌活去蘆

人參

去蘆
一兩

川芎

洗

附子

炮去皮臍
參一兩半

防風

去蘆
二兩

牛膝

去蘆酒浸切
微炒一兩

川當歸

洗去蘆酒浸
焙炒二兩

黃芩

去蘆
微炒

杜仲

去蠶
皮炒

白芍藥

各二兩

甘草

一兩

右判散每服五錢水一盞半生薑七片大棗一枚煎
八分空腹溫服

郁李圓治痢後風手足不能屈伸或麻豆證傳變手足
筋脈急亦能治之

郁李仁

枳殼

川獨活

鱉甲

醋炙
黃

右等分為末木瓜湯調下酒亦可

又方治脚手皆腫不能行步

川烏

赤芍藥

蒼朮

酒浸

土朱

右為末糊圓如梧子大引子同上

通治木香散住腹痛痢

南木香

地榆

一兩

黃連

七錢

青皮

去穢

赤芍藥

枳殼

煨去穢

乳香

甘草

各五錢

右為末每服二錢熱湯調服

黑豆散

小黑豆

炒

川練子

烏梅

甘草

乾薑

罌粟殼

二个去蒂
芎藭

右罌剉煎至七分將紗濾過梘自然汁空腹服

當歸散住瀉痢

地榆

陳皮

罌粟殼

去蒂
芎藭

當歸

去尾

赤芍藥

甘草

肉豆蔻

煨

加黃連

右等分為末每服二錢冷水調服

獨神圓治痢神效

罌粟殼

十兩重分作三分
去穰及蒂萼

一分醋炒
一分蜜炙

一分生用

右為末用蜜圓如小指頭大紅痢生地黃春茶煎湯
嚼下白痢烏梅甘草節但為末二錢陳米鹽梅湯亦
效

神應散治痢緊嚴絕妙

金罌草

肉豆蔻

訶子

地榆

罌粟殼

去蒂
萼

甘草

當歸

去尾

茯苓

白朮

枳殼

去穰

烏梅

各一兩

丁皮

木香

作痛各五錢

陳皮

一兩取紅生血若紅痢勿用

右為圓或末五花痢用春茶陳皮煎湯下如是末用

蜜一匙春茶烏梅煎湯調服

又方

金罌華葉及子

罌粟殼

去穢及蒂萼醋炒

右為末用蜜圓如手指大湯引同上

秘方養臟湯治五色痢經驗

陳皮

去白

枳殼

去穢

黃連

去鬚

南木香

烏梅

去核各五錢重

厚朴

去麤皮薑汁皮

罌粟殼

去蒂膜蜜炒一兩

杏仁

去皮尖

甘草

各五錢重

右剉散五色黑豆棗子煎紅痢生地黃春茶甘草節煎服五色久不效加龍骨赤石脂人參楊芍藥各一兩為末蜜圓烏梅甘草湯下粟米飲亦可立效

大阿膠圓治發熱下痢腹痛至甚肛門痛欲絕者

當歸

阿膠炒

豆蔻

煨

龍骨

赤石脂

大艾

黃連

各半兩

木香

乳香

別研
五錢

白礬

右為末鹽梅肉圓每服三十圓如梧子大陳米飲下

四物湯治血痢

方見婦人科通治類

駐車圓治同上

方見前

九聖圓治下痢赤白日夜無度裏急外重緊痛服之特

效

罌粟

去蒂膜米醋炒
一兩重

川烏

炮去
皮臍

黃連

去鬚

南木香

北赤石脂

枯礬

肉豆蔻

乾薑

白茯苓

去皮各五錢重

右為末醋煮陳米粉糊為圓梧桐子大每服五十圓
空心米飲下腹痛不止當歸乳香湯下又名緊皮圓
立效散治同上

罌粟殼

六兩去蒂萼穰蜜炒赤

當歸 一兩

芍藥

榴皮

地榆

各二兩

甘草 一兩

右剉散每服三錢水一盞同煎溫服

大斷下圓治久痢不止

方見泄瀉類

沒石手圓治臟氣虛弱大腸滑洩次數頻併日漸羸瘠
不進飲食或久患赤白痢脾瀉等疾並皆治之

白朮

三錢

白茯苓

三錢

白薑

切作片
畧炒

訶子

紙裹炮
取皮

赤石脂

別研

丁香

不見皮
各二錢

肉豆蔻

麩裏炮

沒石

麩裏炮

右和勻用湯泡蒸餅為圓小梧桐子大每服三四十
圓米飲吞下粥食前一日三四服棗肉圓亦可

荊芥湯治白痢血痢或婦人血崩

荊芥

楮樹皮

右等分剉散治血崩每服二錢水一盞煎至七分去滓放溫服如血痢則為末冷醋調徐徐呷服白痢熱謝調下神效不可具述

香茸圓治下痢危困

麝香

半錢別研

鹿茸

一兩火燎去毛酥炙

右鹿茸為末方入麝香以燈心煑棗肉圓如梧子大每服五十圓空心服每料加滴乳香半兩尤效有人

苦痢疾凡平時所用罌粟殼之類不可向口往往不救而死唯服此等藥或沒石子圓作效

平胃散治血痢

方見前

右秤一兩入川續斷麓末二錢半拌勻每服二錢水

一盞煎七分服

方見脾胃類

檇白皮散治下痢諸藥不效

檇白皮一握粳米五十粒葱白一握甘草一二寸豉二合水一升取半升頓服小兒量大小加減

百中散治一切痢不問赤白或一日之間一二百行不一服便踈再二三服即愈

罌粟殼

二兩半去上下蒂及穰剉成片子蜜炒令赤色淨秤

厚朴

二兩半去麤皮淨秤用生薑汁淹一宿炙冷薑汁盡為度

右為末每服二三錢米飲調下忌生冷油膩魚鮓毒物
酸石榴皮散治同上

石榴皮

陳皮

甘草

川當歸

罌粟殼

去蒂萼穰各半兩

右剉散用水十盞煎取三盞次用下藥

茯苓

七分

粉草

七分

北五味子

七个

右為末將前藥汁入此三味再煎五七沸去滓空心
溫甚者不過兩劑輕者一劑立效

乳香散治痢疾甚者數服止

人參

白朮

當歸

地榆

阿膠

各一分

蚌粉

炒黃

甘草

各一分

乳香

少許

肉豆蔻

二个

右剉散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服仍兼

服來復丹

方見痼冷類

加減木香煑散治一切痢神妙

木香

甘草

當歸

肉豆蔻

人參

官桂

揚芍藥

訶子

烏梅

去核

阿膠

蚌粉炒

白茯苓

各五錢

罌粟殼

一兩半

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚同

煎去滓空腹服

加味四君子湯治久患痢疾服藥已多而疾不愈且治痢多是攻擊臟腑之藥轉覺難安宜用輕清和氣之藥即愈

人參

白朮

白茯苓

川芎

黃耆

甘草

罌粟殼製同上

右各等分剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚烏梅一個煎溫服

蒲黃散治婦人胎前產後赤白痢

生薑自然汁

年少者十兩
年老二十兩

鴨子

一個打碎入
薑汁內攪勻

右二味煎至八分入蒲黃三錢煎五七沸空心溫服效

治痢無問赤白

玄胡索不以多少新瓦上炒過為末每服二錢米飲調下只一服取效

又方治暑毒濕氣下痢

雄黃一味乾蒸研為末甘草湯調服即效

灸法泄利食不消不作肌膚灸脾腧隨年壯其穴在第十一椎下兩傍各去一寸半

泄利不禁小腹絞痛灸丹田百壯其穴在臍下一寸又灸臍中一二十壯灸關元穴百壯

泄利不嗜食雖食不消灸三報穴在俠臍相去五寸一名循際

秘瀉

小便不通熱證八正散治心經邪熱小便赤澀不通加

燈心枳殼車前草地膚子煎

方見積熱類
所加並半錢

五苓散治小便不通壅上心滿燈心十莖車前草二根

煎湯調

方見傷暑類

通心飲治心經有熱唇焦面赤發熱小便不通每服四

錢水一盞半燈心十莖滑石末一匙麥門冬二十粒桑

白皮七寸煎去滓再入生車前草汁一合攪勻服

方見

小方科諸熱類

瓜蒌散治腹脹小便不通

瓜蒌仁不以多少為末每服三錢溫酒調

不飲用米湯頻服通

為度

虛證八味圓治腎虛小便秘澀不通或過服涼藥者每

服五十圓溫鹽湯下立效

方見虛損類

附子散治小便不通兩尺脈俱沉微乃陰虛故也用淋閉通滑之劑不效者

綿附子

一兩重炮去皮臍鹽水內浸良久

澤瀉

不蛀者一兩重

右剉散每服四錢水一盞半燈心七莖煎隨通而愈
琥珀散治老人虛人心氣閉小便不通

琥珀一味為末每服一錢濃煎人參湯下有驗

利氣散治老人氣虛小便閉塞不通

綿黃耆

去蘆 陳皮 去白

甘草

各等分

右剉散每服三錢水一盞煎服自然流通

參耆湯治心虛客熱乘之小便澁數數而澀

赤茯苓

七錢半

生乾地黄

綿黃耆

去蘆

桑螵蛸

微炙

地骨皮

去骨
各半兩

人參

去蘆

北五味子

去梗

兔絲子

酒浸
研

甘草

炙
各二錢半

右剉散每服新水一盞煎臨熟入燈心二十一莖溫服

轉胞滑石散治胞為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內洩應出不得出小腹急痛不得小便小腹脹不治害人

寒水石

二兩

白滑石

一兩

葵子

一合

亂髮灰

車前子

木通

去皮節
各一兩

右剉散水一斗煮取五升時時服一升即利

八味圓治虛人下元冷胞轉不得小便膨急切痛經四

五日困篤欲死每服五十圓鹽湯下

方見虛損類

葱白湯治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲
死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱閉而不流
氣衝胞系不正

陳皮

三兩

葵子

一兩

葱白

二莖

右剉散水五升煮取二升分三服

洗方治胞轉小便不能通先用

良薑

葱頭

紫蘇莖葉

各一握

右煎湯密室內熏洗小腹外腎肛門留湯再添蘇綿洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣
次用

蜀葵子

二分半

赤茯苓

赤芍藥

白芍藥 各半兩

右剉散每服三錢煎取清汁再暖乘熱調蘇合香圓
三圓并研細青鹽半錢食前溫服

又方炒鹽半斤囊盛熨小腹

治小便秘難小腸脹不急治殺人用葱白三斤細
剉炒令熟以帕子裏分作兩處更替熨臍下即通

大便秘不通風秘脾約麻仁圓治風秘脾約證小便數大
便秘

大黃

赤芍藥

枳殼

炒 各一兩

厚朴

半兩 薑汁炒

麻仁

一兩 別研

右為末煉蜜圓如梧子大每服三十五圓溫水吞服

枳殼散溫水調送下尤妙

方見婦人科護胎類

皂角圓專治有風人臟腑秘澀大效

猪牙皂角

厚枳殼

去穢

羌活

桑白皮

厚枳殼

杏仁

製同下 另研

麻仁

別研

防風

川白芷

陳皮

去白

右等分為末蜜圓如梧子大每服三十五圓溫水吞
下蜜湯亦可

又方皂角圓治大腸有風大便秘結之人宜服

皂角

炙去子

枳殼

去穰

右等分為末煉蜜圓如梧子大每服七十圓空心食
前米飲送下

疎風散治風毒秘結

枳殼

製
半兩

防風

羌活

獨活

檳榔

白芷

歲靈仙

茯苓

炒赤
去刺

麻仁

炒另研

杏仁

湯洗去皮
尖炒另研

甘草

炙
各一兩

右劉散每服二錢半生薑五片蜜一匙水一盞半煎服
枳殼圓治腸胃氣壅風盛大便秘實

皂角

去皮弦
子炙

枳殼

炒

大黃

羌活

木香

橘紅

桑白皮

香白芷

各等分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服七十圓空心米飲

下

又方只用枳實皂角等分為末飯飲為圓亦妙

順氣圓治三十六種風七十二般氣上熱下冷腰脚疼痛四肢無力惡瘡下疳踈風順氣專治大腸秘澁真良方也

大黃

五兩半生用
半溫紙裹煨

山藥

刮去皮

山茱萸肉

麻子仁

微炒退殼
二兩另研

郁李仁

炮去皮研

兜絲子

酒浸炒

川牛膝

酒浸一宿
各二兩

防風

枳殼

炒

川獨活

各一兩

檳榔

二兩

車前子

二兩半

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服二三十圓用茶酒米飲任下百無所忌平旦臨卧各一服久服自然精神強健百病不生

搜風散治大便秘結

青皮

去白

威靈仙

去頭各二兩

大黃

生一兩

大戟

一兩

牛蒡子

四兩

右為末每服一錢人壯實每服三錢蜜酒調服畢嗽

口

二仁圓專治虛人老人風秘不可服大黃藥者

杏仁

去皮尖

麻仁

各另研

枳殼

去穰

訶子

漫火炒
槌去核

右等分末煉蜜圓如梧子大每服三十圓溫水下

氣秘三和散

方見諸氣類

四磨湯治氣滯腹急大便秘澀

大檳榔

沉香

木香

烏藥

右四味於搗盆內各磨半盞和勻溫服有熱者加大黃枳殼名六磨湯

蘇子降氣湯治氣不下降大便不通加枳殼杏仁

方見

諸氣類

橘杏圓治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅

取末

杏仁

湯浸去皮尖另研

右各等分煉蜜圓如梧子大每服七十圓空心米飲

下

蘇麻粥此藥順氣滑大便

紫蘇子

麻子仁

右二味不拘多少研爛水濾取斗煮粥食之

小通氣散治虛人憂怒傷肺肺與大腸為傳送致令秘
澁服燥藥過大便秘亦可用

陳皮

去白

蘇嫩莖葉

枳殼

去穰

木通

去皮節

右等分剉散每服四錢水一盞煎溫服立通

積滯秘結脾積圓治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪朮

三兩

良薑

半兩已上用米醋一升於磁瓶內煮干乘熱切碎焙

京三稜

二兩

青皮

去白一兩

南木香

半兩

不蛀皂角

參大錢燒存性

百草霜

村家家鍋底者佳

右末用川巴豆半兩只去殼研如泥漸入藥末研和

麪糊圓麻子大每服五十圓加至六十圓橘皮煎湯

送下

木香逐氣圓治食積氣滯通利大便兼治脚氣小腸氣
諸氣攻刺腹痛

橘紅

青皮 去白

檳榔 鷄心者
各半兩

南木香 二錢半

川巴豆肉 一錢半 研如泥
漸入藥夾研

右為末生薑自然汁調神麴末為糊圓如麻子大每
服十圓薑湯下如氣攻腹痛枳殼木瓜煎湯下

感應圓治飲食所傷三焦氣滯大便秘澀

百草霜

用村庄家鍋底上
者細研秤二兩

新陳丁香 一兩半

杏仁

去雙仁陳肥者一百四十個去尖湯浸一宿去皮別研及爛如膏

南木香

去蘆頭二兩半

肉豆蔻

去麤皮用滑皮仁二十個

川乾薑

炮製一兩巴豆

七十個去皮心膜研細出盡油加粉

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味擣為末與三味同拌研令細用好蠟匱和先將蠟六兩溶化作汁以重綿濾去滓更以好酒一升於銀石器內煮蠟溶滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用凡春夏修合用清油一兩於鉢內熬令未散香熟次下

下酒煮蠟四兩化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末
秋冬修合用清油一兩半同煎煮熱作汁和蠟置藥
末成劑分作小鉞子以油單紙裹之旋圓服餌

虛秘半硫圓治年高冷秘及痊癖冷氣

生硫黃

半夏等分

右為末生薑自然汁煮麪糊為圓如梧子大每服三
十圓空心飯飲下酒亦可

金液丹治大便挾冷結滯用麻仁杏仁煎湯下傷寒陰

結亦用

方見痢冷類

歲靈仙圓治年高氣衰津液枯燥大便秘結

黃耆

蜜炙

枳實

歲靈仙

右等分為末用蜜圓如梧子大每服五六十圓薑湯熟水下一方用防風無黃耆忌茶

五仁圓治津液枯竭大腸秘澁傳導艱難

桃仁

杏仁

炒去皮各一兩

柏子仁

半兩

松子仁

一錢

郁李仁

炒一兩

陳皮

四兩
另為末

右將五仁別研為膏入陳皮末研勻煉蜜為丸如梧
子大每服五十圓空心米飲下

潤腸圓治發汗利小便亡津液大腑秘老人虛人皆可
服

沉香

另研
一兩

肉蓯蓉

酒浸焙
二兩

右為末用麻子仁汁打糊為圓如梧子大每服七十
丸空心米飲送下

又方治大便秘澁連日不通

麻子仁

一盞半細研用水浸漉去皮取濃汁

脂麻

半盞微炒研用水浸取濃汁

桃仁

湯洗去皮麩炒黃研如泥

荊芥穗

搗末各一兩

右用前藥入鹽少許同煎可以當茶飲之以利為度

葱白散治老人大便不通

葱白

二莖

阿膠

一片

右以水煎葱候熟不用却入阿膠溶開溫服

胃氣散治老人胃寒氣怯大便反秘每服五十九米飲

空腹下未效生薑自然汁著熱水少許吞下

方見霍亂類

黃耆湯治年高老人大便秘澁

綿黃耆

陳皮

去白各半兩

右為末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取漿水一盞漉去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無秘澁之患此藥不冷不燥其效如神

熱秘神功圓治氣壅風盛大便秘澁後重疼痛煩悶此藥當量虛實加減

大黃

四兩根
蒸皆可

人參

二兩

訶子皮

四兩

麻仁

二兩
另研

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九溫湯酒米飲任意下食後臥服

檳榔圓治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便秘結

檳榔

大黃

蒸

麻子仁

炒去殼
別研

枳實

麩炒

羌活

去蘆

杏仁

去皮尖
炒

牽牛

炒

白芷

黃苓

各一兩

人參

半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十九空心熟水下
四順清涼飲治同上每服三錢水一盞半燈心十莖枳

殼十片去穰煎立效

方見積熱類

小三黃圓治熱証大便秘結每服三十圓溫水下

方見

積熱類

小柴胡湯治傷寒陽結能食而大便不下

方見傷寒陽証類

濕秘櫛榔散治腸胃有濕大便秘澁

檳榔

不拘多少

右為末每服二錢用蜜湯點服不以時候

香蘇散多加枳殼檳榔亦效

方見傷寒和蘇類

通治甘遂散治大小便不通

右以甘遂二兩赤皮者為末煉蜜二合和勻每一兩

重分作四服日進一服蜜水下未知日二脈漸加之

又方葵子末三合青竹葉一把水一升煮五沸頓服

又方葵子末三合水一升煮去滓分作二服豬脂二兩

空心服

又方治大小便閉格不通經三五日者用不蛀皂角燒灰米湯調下即通

又方猪脂二兩水一升煮三沸飲汁立通

八正散治同上

方見積熱類

推車散治大小便秘經月欲死者

推車客 七个

土狗 七个

如男子病推車客用頭土狗用身
如女子病土狗用頭推車客用身

右新瓦土焙乾為末用虎目樹皮向南者濃煎汁調
只一服經驗如神

又掩臍法治大小便不通用連根葱一莖帶土不洗以
生薑一塊淡豉二十一粒鹽二匙同研爛搗餅烘熱
掩臍中以帛扎定良久氣透自通不然再換壹劑
通治大便不通大潤腸圓大便秘澁通用

杏仁

去皮尖
微炒

枳殼

浸去
穢

麻仁

陳皮

各半兩

阿膠

炒

防風

各二錢半

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九老者蘇子煎湯下壯者荊芥泡湯下

獨棗湯治大便積日不通

大好棗

一枚擘開入輕粉半錢

右以棗相合麻線扎縛慢火煮熟嚼細以棗汁送下敷藥治閉結至亟昏不知人生大螺一二枚以鹽一匙和殼生搗碎置病者臍下一寸三分用寬帛緊繫之即大通未效烏柏木根三寸研井水服亦效就多研

爛敷臍下亦可

蜜炷法蜜三合入猪膽汁兩枚在內煎如飴以井水出
冷候凝撚如指大長三寸許納下部立通活人書單
用蜜一法入皂角末在人斟酌用一法入薄荷末代
皂角用尤好人或偶無蜜只嚼薄荷以津液調作挺
用之亦妙

煨蒜方獨頭蒜煨熟去皮以綿裹納後部自通
熏方不蛀皂角用碗燒置於桶內其後部自通

老人臟腑秘不可用大黃老人津液少所以臟腑秘澁
更服大黃以瀉之津液皆去定須再秘甚於前只可
服寬潤大腸之藥更用槐花煎湯淋洗亦效更有老
人發熱而大腑秘澁或因多服丹藥脾胃虛弱消化
不行遂為臟腑積熱須用神保圓得通瀉一行熱亦
即退

脹滿

風寒暑濕脹大正氣散治脾胃怯風寒濕氣傷動冲和

心腹脹滿有妨飲食

厚朴

薑製炒

藿香葉

半夏

橘紅

白朮

各一兩

甘草

炙

檳榔

桂枝

不見火

枳殼

去穢炒

乾薑

炮各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片棗子二枚煎至七分去滓不以時溫服

疏順飲子治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿連兩脇妨悶頭暈嘔逆脈來浮弦

防風

去蘆

桂枝

不見火

枳殼

去穰炒

赤芍藥

桔梗

去蘆炒各一兩

木香

不見火

人參

檳榔

當歸

去蘆酒浸

川芎

橘紅

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞薑五片煎七分不拘時溫

服

五膈寬中散治七氣流滯飲食不下氣滿膨脹

方見五膈類

木香流氣飲調榮衛利三焦行痞滯消脹滿

方見諸氣類

附子粳米湯治憂怒相乘神志不守思慮兼并擾亂臟

氣不主傳使諸陽不舒反順為逆中寒氣脹腸鳴腹痛
胸脇逆滿嘔吐不食

附子

一个去生皮
臍虛人畧炮

半夏

湯洗
七次

粳米

各三錢

甘草

炙
一錢半

乾薑

一分
去皮

右剉每服二錢水一盞棗三個煎至七分去滓食前
服

溫胃湯治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與胃氣
不平脹滿銜欬食不得下脈虛而緊瀉

附子

炮去皮劑

當歸

厚朴

去麋皮生用

人參

橘皮

白芍藥

甘草

炙各一兩

乾薑

一分

川椒

炒出汗去合口者三分

右剉散每服四大錢水二盞煎七分去滓食前服

沉香降氣湯治中脘脹滿時復脇肚痛楚每噫則覺氣

快氣不噫則悶漸覺面浮磨檳榔入紫蘇同煎下神丸

五七圓

二方並見諸氣類

穀脹大異香散治失飢傷飽痞悶停酸早食暮不能食

名穀脹

京三稜

蓬朮

青皮

陳皮

半夏麴

藿香

北梗

益智仁

枳殼製

香附子

炒
各半兩

甘草

炙
三分

右剉散每服三錢水盞半薑五片棗二枚煎服
草澄茄圓治痞滿脹痛穀脹氣脹通用

草澄茄

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

蘿蔔子

木香

各二分

肉豆蔻

煨

茴香

炒

辣桂

丁香

各一分半

陳皮

三分

右為末麴煑稀糊丸梧桐子大每服三十九陳皮湯

下

水脹大半夏湯治脾土受濕不能制水水漬於腸胃溢於皮膚漉漉有聲怔忡喘息名水脹

半夏

湯洗

陳皮

茯苓

桔梗

檳榔

甘草

各等分

右剉散每服三錢水一盞半薑三片煎溫服

青木香圓治同上

方見諸疝類

血脹人參芎歸湯治煩燥嗽水迷忘驚狂痛悶喘惡虛汗厥逆小便多大便黑名血脹

當歸

半夏

製同上
三分

川芎

一兩

蓬朮

煨

木香

縮砂仁

烏藥

甘草

炙各
半兩

人參

辣桂

去麋皮

五靈脂

炒

各一分

右判散每服三錢薑五片棗二枚紫蘇四葉煎食前服

熱脹七物厚朴湯治腹滿發熱以陽并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱脈必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如故致脹滿者為熱脹

厚朴

薑汁炒
一兩

甘草

炙

大黃

蒸各三
力三字

枳實

麩炒去穢
半兩

桂心

一分

右剉散每服四錢水盞半生薑七片棗三枚煎至七分食煎服嘔加半夏利者去大黃寒多則加生薑十片煎

推氣圓治三焦痞塞氣不升降胸膈脹滿大便秘澀小便赤少並宜服之

大黃

陳皮

檳榔

枳殼

小者去穰

黃芩

黑牽牛

生用各等分

右為蜜丸如梧桐子大每服五七十九臨卧以溫然水下更量虛實加減

寒脹朴附湯治老人虛人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脈來浮遲而弱此名寒脹

附子

炮去皮臍

厚朴

薑製少

右等分剉散每服四錢水二盞生薑七片紅棗二枚

煎至八分去滓溫服不拘時候加少木香尤佳

順氣木香散治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞悶脇肋脹滿及酒食所傷噎氣吞酸心脾刺痛大便秘不調面色痿黃肌肉消瘦不思飲食兼婦人血氣刺痛及一切冷氣並治之

丁香

不見火

縮砂仁

良薑

去蘆

肉桂

去皮麝

乾薑

炮

甘草

炙

陳皮

去白

厚朴

去麁皮
薑汁炙

蒼朮

米泔浸
炒

桔梗

去蘆

茴香

炒
各三兩

右剉每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至八分
稍熱不拘時或入鹽少許沸湯點服寬中順氣和胃
進食

食脹強中湯治脾胃不和食啖生冷過飲寒漿多致腹
脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

乾薑

炮去土

白朮

各一兩

青皮

去白

橘紅

人參

附子

炮去皮臍

厚朴

薑製

甘草

炙各半兩

草果仁

丁香

各三兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片大棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時嘔者加半夏半兩或食麴致脹滿加蘿蔔子半兩

溫中散治虛人老人喜啖生冷多致腹脹心下痞滿有妨飲食或刺痛洩利氣痞滯悶

厚朴

去皮細剉

甘草

細剉

青州棗

生薑

洗切

右以厚朴甘草搗令得所方入生薑再杵令勻取出
同棗焙令浥浥微燥却入鍋內慢火炒至紫色再焙
乾為末每服一大錢擦生薑少許沸湯點空腹以和
為度氣味甚美兼能愈疾又易修合

桂香圓治大人小兒過食雜果腹脹氣急

肉桂

不見火
一兩

麝香 另研

右為末飯丸如菉豆大大人十五圓小兒七圓不拘
時熟水送下未痊再服

獨聖散治脾胃不足過食瓜果心腹堅脹痛悶不安

鹽五合

右用水一升煎消頓服自吐下即定或因食麥令人腹脹暖酒和薑汁飲一兩盃即消

感應圖治積食停滯脾胃作脹

方見秘澁類

北亭圓治稟受怯弱脾胃易傷因此積聚中脘脹滿心

腹堅硬疝痛攻衝牽引小腹如蠱之狀

方見虛損類

溫中圓治心腹積聚九癥癖塊腹脹心下堅結大如杯

梔子攻兩脇心痛積年食不消化

吳茱萸

湯洗七次焙炒

桔梗

柴胡

去蘆

菖蒲

紫苑

黃連

去鬚

乾薑

炮

肉桂

去麋皮

茯苓

去皮

蜀椒

去目及閉口者炒出汗

人參

去蘆

厚朴

去麋皮薑汁製

巴豆

去皮心膜出油炒研已上各半兩

川烏

炮去皮臍二兩半

皂莢

去皮子炙半兩

右為末入巴豆令勻煉蜜圓如梧子大每服三十九

紫蘇湯下取下積滯如魚腦爛綿而安

鼓脹嘉禾散四柱散治脾胃虛憊腹脹如絢鼓氣宇喘

促食後愈甚

方見脾胃類

四柱散方見泄瀉類

厚朴橘皮煎治傷冷澹下腹肚脹其狀如覆拷拷喘息奔急鼻張口呿氣上下不得分泄

厚朴

去麤皮薑製三兩

枳殼麩炒

乾薑炮

良薑

切各一兩二錢

青皮去白

陳皮去白

肉桂去麤皮

全蝎

去尾足毒斟酌分兩

右為末醋糊圓如梧子大每服三十九生薑橘皮湯

吞下或紫蘇湯下

三稜煎圓青木香圓治心腹堅脹喘滿短氣緊促噫氣
不通飲食不消或嘔逆吐痰或腸中水聲大便或秘或
泄二藥合和每服三十圓食後米飲下

方見諸氣諸疝類

四炒枳殼圓主腹脹鼓疾

枳殼

去穢四兩

右分作四分每分一兩一分用剉散碎蒼朮一兩同
炒一分用蘿蔔子一合同炒一分用乾漆一兩同炒

一分用茴香一兩同炒各以枳殼黃為度只取枳殼一味為末却將蒼朮等四味用水二椀煮至一椀半去滓取汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九食後米飲下

氣針圓專治氣膨

全蝎

去毒并足

木香

丁香

不見火

胡椒

肉豆蔻

煨各一兩

片子薑黃

青皮

去白各二兩

右為末用蘿蔔子炒淨退殼取仁四兩爛研和藥令

勻紅酒生薑汁各少許煮糊丸如梧子大每服四五
十圓紫蘇陳皮湯下不以時候

丁沉透膈湯治氣滿不食腹中膨脹刺痛

方見脾胃類

導氣圓治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便結秘等証
又腎氣小腸氣等功效尤速

青皮

水蛭等分同
炒赤去水蛭

蓬莪朮

蛭虫等分同
炒去蛭虫

胡椒

茴香炒
去茴香

三稜

乾漆炒
去乾漆

茱萸

牽牛炒
去牽牛

赤芍

川椒炒
去川椒

石菖蒲

桃仁炒
去桃仁

檳榔

斑貓炒
去斑貓

乾薑

硃砂炒
去硃砂

附子

青鹽炒
去鹽

右各剉碎與所註藥炒熟去水蛭等不用祇以青皮等十味為末酒糊丸如梧子大每服五十九加至七十圓空心紫蘇湯吞下

尉法治腹脹緊如鼓澁如木皮樣

杜烏藥

荊芥

蒼朮

茵草

山茵陳

夏蚕沙

松毛

樟根葉

北蒜

螃蚰葉

橘葉

椒目

烏豆

赤豆

藟各等分

右剉細分作二次炒熟以布袋盛熨腫處冷又炒熨
三四十度或後用煎水熏洗或服神保圓微瀉泄去
其氣

敷藥治腹緊硬如石或陰囊腫大先用熱水嚼甘草後
用

大戟

芫花

甘遂

海藻

各等分

右為末醋調塗或用白麪和藥調一片覆肚上

通治沉香飲治腹脹氣喘坐卧不得

沉香

木香

枳殼

各半兩

蘿蔔子

炒

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎七分溫服
檳榔治脾虛腹脹不進飲食快氣寬中

蘿蔔子

炒

檳榔

煨

黑牽牛

炒

木香

各半兩

右末水煮麪糊圓梧桐子大每服三十圓薑湯食前
下

灸法脹滿水腫灸法膺隨年壯穴在第十一椎下兩傍

各去一寸半

胸滿心腹積聚痞痛灸肝膈百壯穴在第九椎下兩傍各去一寸半


腹脹滿繞臍結痛堅不能食灸中守穴百壯在臍上一寸一名水分

胸滿腹聚滯下冷疼灸氣海十壯穴在臍下一寸五分

腸中膨脹不消灸大腸膈四十九壯穴在第十六椎

下兩傍各一寸半

腸中雷鳴相逐痢下灸承滿五十壯穴在俠巨闕相
去五寸巨闕在心下一寸灸之者俠巨闕兩邊各二
寸半五臟六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來
小便不利羸瘦少氣灸三焦腧隨年壯穴在十三椎
下兩傍各一寸半



世醫得效方卷六